



**NutriFert®**  
Damos Nutrición a su Cultivo...

**FICHA TÉCNICA**

# NUTRIFERT N20

## BIOESTIMULANTE A BASE DE NITROGENO

**Nombre comercial: Nutrifert N20**

**Grupo: Bioestimulante**

**Grado: Agrícola**

**Comercializado por: Nutrifert Chile Ltda.**

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

**Nutrifert N20** es un Bioestimulante foliar a base de nitrógeno en una base de biofermentado de algas marinas con efecto bioestimulante, especialmente diseñado para ser usado desde el inicio de la actividad vegetativa, durante el crecimiento de los frutos, en frutales después de la cosecha tanto vía foliar como por vía radicular. Incrementa el tenor proteico de cereales y leguminosas. Aumenta las reservas de nitrógeno para la siguiente estación.

Posee además componentes orgánicos bioactivos gracias a su concentración de algas biofermentadas en la formulación que permite aumentar la actividad antioxidante de las plantas, promoviendo la defensa frente a radicales libres.

### COMPOSICIÓN MÍNIMA

Nitrógeno	(N)	.....	20%p/v
<i>Lessonia</i>	<i>trabeculata</i>	.....	10%p/v
Ácidos	carboxílicos	.....	5%p/v

### PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS

pH	: 5
Densidad g/L	: 1120 a 20°C
Solubilidad en agua:	100% a 20°C



**NutriFert**<sup>®</sup>  
Damos Nutrición a su Cultivo...

**FICHA TÉCNICA**

# NUTRIFERT N20

## BIOESTIMULANTE A BASE DE NITROGENO

### Recomendaciones de uso.

CULTIVO	DOSIS (L/ha)	Concent. (cc/100 L agua)	RECOMENDACIONES DE USO
Manzanas, Perales, Membrillos	2-3	300 cc/hL	Aplicar a inicios de botón floral e inicios de brotación, inicio de crecimiento de fruto y en postcosecha.
Limones, Naranjos, Mandarinos, Pomelos, Tangelos, Clementinas	2-3	300 cc/hL	Aplicar antes de flor, Inicio de formación de fruto y en post cosecha
Cerezos, Ciruelos, Durazneros, Damascos, Nectarinos, Almendros, Olivo, Nogal y Avellano, Pecanos	2-3	300 cc/hL	Aplicar a inicios de botón floral e inicios de brotación, inicio de crecimiento de fruto y en postcosecha.
Uvas de mesa, uva vinífera y pisquera.	2-3	300 cc/hL	Aplicar en Brote (20 a 50 cm.), durante el desarrollo del fruto, aplicar en post cosecha.
Paltos, Chirimoyos, Granado, Bananos, Mango, Café, Cacao	2-3	300 cc/hL	Aplicar antes de floración, crecimiento de frutos y en postcosecha.
Kiwi	2-3	300 cc/hL	Aplicar antes de floración, crecimiento de frutos y en postcosecha
Frutillas (Fresas)	2-3	300 cc/hL	Aplicar inicio crecimiento vegetativo e inicio crecimiento de frutos.
Arándano, Frambuesa, Mora, Grosellas, Zarparrillas, Murta	2-3	300 cc/hL	Aplicar a inicios de brotación, inicio crecimiento de frutos y en postcosecha.
Tomate, Pimiento, Paprika Berenjena, Aji	2-3	400 cc/hL	Aplicar 5 días después del trasplante o emergencia. Repetir aplicaciones cada 10-15 días.
Lechugas, Espinaca, Acelga, Endivias, Repollo, Achicoria, Coliflor, Brocoli, Betarraga, Alcachofas, Zanahorias, Tomate, Pimentón, Paprika, Aji, Berenjena, Apio	2-3	400 cc/hL	Aplicar 10-15 días después del trasplante o emergencia. Repetir aplicaciones cada 15 días.
Arroz, Trigo, Avena, Cebada, Lupino	2-3	400 cc/hL	Aplicar 2 a 5 hojas, a 45 días después de germinación y a Inicio de formación de grano.
Arvejas, Porotos (Frejol), Habas, lentejas, Vainita, Poroto verde	2-3	400 cc/hL	Aplicaciones desde inicio crecimiento vegetativo e inicio de crecimiento de fruto (vainas)
Brócoli, Coliflor	2-3	400 cc/hL	4 - 6 aplicaciones empezando antes de la formación de la cabeza.
Pepinos, Melones, Pimientos, Sandías, Berenjenas, Zapallos, Zapallos italianos, Cucurbitáceas	2-3	400 cc/hL	Aplicar a partir de 4 a 6 hojas, repetir aplicaciones cada 10-14 días.
Papas	2-3	400 cc/hL	Aplicaciones de inicio crecimiento vegetativo e inicio de tuberización.
Cebollas, Ajos, Flores bulbosas	2-3	400 cc/hL	Aplicar 15 días después del trasplante y 75 después del trasplante.
Maíz	2-3	400 cc/hL	Aplicar con 4 a 6 hojas, repetir a inicios de panoja y a inicio de llenado de grano hasta grano lechoso
Espárragos	2-3	400 cc/hL	Aplicar a la apertura del meristema apical.
Remolacha, Raps, Betarragas	2-3	400 cc/hL	Aplicaciones desde inicio crecimiento vegetativo cada 15 días.
Caña de Azúcar, Algodón, Soya, Maravilla	2-3	400 cc/hL	Aplicar desde inicio de crecimiento vegetativo cada 15 días.
Plantas ornamentales, Praderas	2	400 cc/hL	Aplicar desde inicio de crecimiento vegetativo cada 15 días.

### ADVERTENCIAS

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos a toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se va de nuestro control directo.

### PRESENTACIONES:

1, 5 y 20 Litros

Las Virginia 1045 Rengo, VI Región - Chile - Contacto: +56 9 71281173 +56 9 3370 0270



**NS GROUP**  
HOLDING  
PART OF

[www.nutrifert.cl](http://www.nutrifert.cl) - [contacto@nutrifert.cl](mailto:contacto@nutrifert.cl)