



NutriFert®
Damos Nutrición a su Cultivo...

FICHA TÉCNICA

NUTRGROW BALANCE

BIOESTIMULANTE DE CRECIMIENTO

Nombre comercial: Nutrigrow Balance

Grupo: Bioestimulante

Grado: Agrícola

Comercializado por: Nutrifert Chile Ltda.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Nutrigrow Balance no es tóxico por ser de origen vegetal, por lo que no hay riesgo por ingestión, inhalación, contacto dérmico u ocular. No se almacene ni transporte junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Nutrigrow Balance debe ser mezclado en suficiente agua para obtener un buen cubrimiento del follaje. Puede ser aplicado con equipo terrestre o aéreo.

COMPOSICIÓN MÍNIMA

Macro y Microelementos:

Manganeso (Mn)	1,4%p/v
Zinc (Zn)	3,0%p/v
Magnesio (Mg)	1,2%p/v
Boro (B)	0,6%p/v
Azufre (S)	4,5%p/v
Cobre (Cu)	1,3%p/v
Calcio (Ca)	0,25%p/v
Nitrógeno (N)	0,6%p/v

Extractos de Algas Marinas:

<i>Ecklonia maxima</i>	12,5 % p/v
<i>Ascophyllum nodosum</i>	12,5 % p/v

PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS

pH	: 4
Densidad g/L	: 1200 a 20°C
Solubilidad en agua:	100% a 20°C



NutriFert®
Damos Nutrición a su Cultivo...

FICHA TÉCNICA

NUTRGROW BALANCE

BIOESTIMULANTE DE CRECIMIENTO

Recomendaciones de uso.

Cultivo	Dosis	Epoca de Aplicación
Acelga, Ajo, Brócoli, Coliflor, Cebollas, Habas y Arvejas.	450-500 cc/ha	Al haber 2 a 5 pares de hojas y 10-15 días después.
Arandanos, Frambuesas y Frutillas.	450-500 cc/ha	Inicios de la floración y repetir cada 3-4 semanas.
Tomate, Pimentón, Pepino.	450-500 cc/ha	Al inicio de la floración y repetir a la aparición de frutos.
Melón, Sandía y Zapallos	450-500 cc/ha	Al inicio de la floración y repetir a la aparición de frutos.
Apio, Espinaca y Lechuga.	450-500 cc/ha	Al inicio de la floración y repetir a la aparición de frutos.
Trigo y Maíz.	450-500 cc/ha	Al inicio de macolla, al segundo nudo en maíz y sorgo.
Nogales, cerezos, ciruelos, almendros, carozos, kiwi, pomáceas y avellano.	1 L/1000L/agua	Durante la floración y hasta la caída de pétalos.
Uva de mesa.	750 cc/1000L/agua	Al inicio, 50% y al 80% de la floración. Cuarta aplicación cuando las bayas tengan 6-8 m, quinta aplicación 5 días después y sexta otros 5 días después.
Uva vinífera.	2 l/1000 L/agua	Al inicio de floración y a las 3-4 semanas.
Mango, Paltos, Naranjos, Limónes, Mandarina y Pomelo.	450-500 cc/ha	Dos semanas después del inicio de floración hasta la caída de pétalos.
Papa.	500 cc/ha	Al inicio de formación de tubérculo y repetir a los 15-30 días.
Alfalfa, Remolacha, Raps y Praderas.	450-500 cc/ha	Aplicar cuando la planta tenga 10-15 cm de altura y repetir a las 10-20 hojas después de cada corte.

ADVERTENCIAS

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos a toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se va de nuestro control directo.

PRESENTACIONES:

1, 5 y 20 Litros

Las Virginias 1045 Rengo, VI Región - Chile - Contacto: +56 9 71281173 +56 9 3370 0270



www.nutrifert.cl - contacto@nutrifert.cl