



NutriFert®
Damos Nutrición a su Cultivo...

FICHA TÉCNICA

PROMAX XL

**BIOESTIMULANTE DE GRAN PODER BIOACTIVO PARA
CUAJA Y ENGORDE DE FRUTOS**

Nombre comercial: PROMAX XL

Grupo: Bioestimulante

Grado: Agrícola

Comercializado por: Nutrifert Chile Ltda.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

PROMAX XL Es un bioestimulante para promover floración, cuaja, engorda y crecimiento de raíces.

PROMAX XL tiene un gran poder bioactivo debido a la presencia de extracto de aminoácidos, lo que lo hace ser un gran producto para crecimiento de frutos.

COMPOSICIÓN MÍNIMA

Aminoácidos Libres	8% p/v
Potasio (K_2O)	30% p/v
Fosforo (P_2O_5)	20% p/v
Zinc (Zn) Quelatado	0,002% p/v
Manganeso Quelatado	0,003% p/v
Hierro Quelatado	0,004% p/v
Boro	0,9% p/v
Cobre (Cu) Quelatado	0,001% p/v

PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS

pH	: 8
Densidad g/L	: 1300 a 20°C
Solubilidad en agua:	100% a 20°C



NutriFert®
Damos Nutrición a su Cultivo...

FICHA TÉCNICA

PROMAX XL

BIOESTIMULANTE DE GRAN PODER BIOACTIVO PARA CUAJA Y ENGORDE DE FRUTOS

Recomendaciones de uso.

Cultivo	Dosis cc/hL	Nº de aplic.	Momento de aplicación
Vid de Mesa para crecimiento de brote.	250 - 300	2 - 3	Primera: Brote 10 a 15 cm. Repetir cada 10 días.
Vid de mesa para crecimiento de baya.	800 - 1000	1	Una aplicación por temporada dirigida a los recimos.
Kiwi.	350 - 500 500 - 1000	2 - 3	En botón floral. Con 50 % caída de pétalos. Repetir a los 7 días.
Arándanos, Frutillas, Moras, Frambuesas.	350 - 500 250 - 300	3 - 4	Desde 10% de flor junto con Nutrifert Calcio-Boro. Repetir cada 10 a 15 días.
Naranja, Limoneros, Pomelos, Mandarinos, Olivos, Paltos.	300 - 500	1 - 2	En botón floral con 50% caída de pétalo. Repetir a los 7 - 10 días.
Cerezos.	300 - 500	2	Primera: 50% caída de pétalos. Segunda: 10 - 15 días después.
Tomates, Ají, Pimientos.	250 - 300	2 - 3	Aplicar en plena floración junto con Nutrifert Calcio-Boro. Repetir cada 15 - 20 días.
Ajo, cebolla, puerro.	250 - 300	2	Primera: 20 días después del trasplante. Segunda: 30 días antes de cosecha.
Frejol, arveja, haba, maravilla, lupino, maíz grano, maíz dulce.	250 - 300	1 - 2	Comenzar con 2 a 4 hojas verdaderas. Repetir a los 15 días
Melones, sandías, zapallos.	250 - 300	2 - 3	Comenzar entre plena flor e inicio de cuaja y repetir cada 15 días. Compatibilizar aplicaciones con Nutrifert Calcio-Boro y Pinta Plus.
Trigo.	250 - 300	1	Aplicar con 3 a 4 hojas junto a programa nutricional Nutrifert para trigo.
Brócoli, coliflor, repollo.	250 - 300	2 - 3	Comenzar entre la 4 - 5 hoja y repetir a los 15 días.
Papa, Camote.	250 - 300	2	Primera: Inicio tuberización. Segunda: 15 días antes de cosecha.
Manzanos, perales.	250 - 300	2	Primera: 50% caída de pétalo. Segunda: 10 días después.

ADVERTENCIAS

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos a toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se va de nuestro control directo.

PRESENTACIONES:

1, 5 y 20 Litros

Las Virginias 1045 Rengo, VI Región - Chile - Contacto: +56 9 71281173 +56 9 3370 0270



NS GROUP
HOLDING
PART OF

www.nutrifert.cl - contacto@nutrifert.cl